

【基準値設定項目】 ※eGFR

| コード | 項目 | 変更内容 | 新 | 旧 | 検査案内掲載ページ |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 1981 | eGFR | 基準値 | 60以上 | 設定なし | 無 |

【検査方法変更】 ※CA125、CA15-3

| コード | 検査項目 | 変更内容 | 新 | 旧 | 検査案内掲載ページ |
|------|--------|-------|-------------|------------|-----------|
| 0291 | CA125 | 検査項目名 | CA125/CLIA | CA125 | p.52 |
| | | 検査方法 | CLIA法 | CLEIA法 | |
| 0601 | CA15-3 | 検査項目名 | CA15-3/CLIA | CA15-3 | p.52 |
| | | 検査方法 | CLIA法 | CLEIA法 | |
| | | 基準値 | 31.3U/mL以下 | 27.0U/mL以下 | |

※ その他の変更はございません 相関図は別紙参照

【改良試薬への変更】 ※PSA-ACT、HBV核酸定量、HCV核酸定量

| コード | 検査項目 | 変更内容 | 新 | 旧 | 検査案内掲載ページ |
|------|---------|-------|--|--|-----------|
| 0618 | PSA-ACT | 検査項目名 | PSA-ACT/CLIA | PSA-ACT | p.52 |
| | | 検査方法 | CLIA法 | EIA法 | |
| | | 基準値 | 3.4ng/mL以下 | 1.1ng/mL以下 | |
| | | 備考 | 前立腺肥大症と前立腺癌の判別のカットオフ値は7.0ng/mLが推奨されます。 | 前立腺肥大症と前立腺癌の判別のカットオフ値は4.8ng/mLが推奨されます。 | |
| 2241 | HCV核酸定量 | 報告範囲 | 検出せず、<1.2+、1.2~8.1以上 | 検出せず、<1.2+、1.2~8.0以上 | p.62 |
| 2219 | HBV核酸定量 | 検査項目名 | HBV核酸定量(IU) | HBV核酸定量(HBV-DNA定量) | p.60 |
| | | 報告単位 | L.IU/mL(LogIU/mL) | LC/mL(LogCopy/mL) | |
| | | 報告範囲 | 検出せず、<1.0+、1.0~9.1以上 | 検出せず、<2.1+、2.1~9.0以上 | |

※ その他の変更はございません 相関図は別紙参照

平成29年3月