

事業所名

富山市医師会健康管理センター

所属部署名

業務部

氏名

健診 花子

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|----------|------|----------------------------|--|------|---------------|--|------|------------------|--|-------|-------------------|--|----|-----------------|--|---------------|--|------|----------|-----|----------|-----|-------|----|-----|-----|
| 氏名 | ケンシン ハナコ | | 内科診察 | 不整脈、心雑音、肝触知、頸部リンパ節腫大、甲状腺腫大 | | 眼科 | 右 | | OCT | 総ビリルビン 0.44 | | 胃部 | 胃体部ポリープ、萎縮性胃炎 | | A | 頸部細 | | class I, NLIM | | 甲状腺 | ホルモン | | TSH | | FT3 | | FT4 | |
| | 健診 花子 | | | | | | 左 | | | | | | AST(GOT) 16 | | | | | 体部細 | | | | | 超音波 | | | | | |
| 生年月日 | 1970/03/31 | | 身体計測 | 身長 160.5 | | 胸部 | 胸部X線 | | D2 | 右 右下肺野浸潤影、心陰影拡大 | | 胃部 | 胃内視鏡 | | 子宮 | A | | 検査範囲異常なし | | 鉄代謝 | Fe | | | | | | | |
| 年齢 | 45 | 性別 女 | | 体重 54.0 | | | 胸部CT | | | | | | | | | 膵臓 | | 膵臓 | | | | | 膵臓 | | 膵臓 | | | |
| 保険証記号 | 1550 | 保険証番号 12 | 聴力 | BMI 20.9 | | 心臓機能 | 聴力会話法 | | A | 可 | | 大腸 | ABC検査 | | A | 骨密度 | | 0.551 | | 便検査 | Zスコア | | 90 -0.96 | | | | | |
| 受診日 | 2021/04/01 | 受診番号 1 | | 1000Hz (30dB) 右 可 | | | 胸部X線 | | | 1回目 H 166 / H 99 | | | 2回目 H 167 / H 100 | | | 平均 H 166 / H 99 | | 便潜血 | | | 1日目 (-) | | 2日目 (-) | | 大腸内視鏡 | | | |
| 健診コース | 協会けんぽ一般健診 | | 聴覚 | 4000Hz (40dB) 右 可 | | 糖代謝 | 血糖 | | A | L 65 | | 腹部超音波 | 膵臓 | | A | 膵臓 | | 膵臓 | | 膵臓 | | 膵臓 | | 膵臓 | | 膵臓 | | |
| 既往歴 | 虫垂炎 治療完了10歳、胃潰瘍 治療完了35歳 | | | 4000Hz (30dB) 右 可 | | | 心拍数 | | | 77 | | | 尿酸 | | | A | | 尿酸 | | 4.1 | | 尿糖 | | (-) | | 尿糖 | | (-) |
| 現病歴 | 高血圧 治療中55歳、糖尿病 定期観察55歳 | | 聴覚 | 1000Hz (30dB) 左 可 | | 腎機能 | 尿素窒素 | | A | 10.4 | | 乳房 | 乳房X線 | | A | 右 I | | 検査範囲異常なし | | 就業区分 | 通常勤務 | | 就業制限 | | 要休業 | | | |
| 自覚症状 | 目が疲れる、胃が痛い、腰が痛い、頭痛 | | | 4000Hz (30dB) 左 可 | | | ヘマトクリット値 | | | 46.7 | | | e-GFR | | | 78.00 | | 左 I | | | 検査範囲異常なし | | 産業界の意見 | | | | | |
| 喫煙 | 吸わない | | 聴覚 | 矯正(5m) 右 0.80 | | 血液一般 | 好中球 | | B | 65 | | 乳房 | 乳房超音波 | | C | 赤血球 | | 1個未満 | | | | | | | | | | |
| 飲酒頻度 | 週7日 | | | 矯正(5m) 左 1.50 | | | 好塩基球 | | | 1 | | | 好酸球 | | | 1 | | 白血球 | | 1個未満 | | | | | | | | |
| 総合判定 | D2 | | 聴覚 | 裸眼(5m) 右 0.03 | | 血液一般 | リンパ球 | | 26 | 単球 | | 7 | 尿沈渣 | | A | 扁平上皮 | | 1個未満 | | | | | | | | | | |
| | | | | 裸眼(50cm) 右 可 | | | 矯正(50cm) 右 可 | | | MCH | | | 30.4 | | | 移行上皮 | | (-) | | 尿管上皮 | | (-) | | | | | | |
| 判定医師 | 中西 博子 | | 眼科 | 裸眼(5m) 両眼 可 | | 血液一般 | 血小板数 | | 28.7 | PH | | 7 | 尿沈渣 | | A | 顆粒円柱 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 矯正(5m) 両眼 可 | | | 裸眼(50cm) 両眼 可 | | | 矯正(50cm) 両眼 可 | | | 色覚 | | | | | | | | | | | | | | | |
| メタボリックシンドローム判定 | 非該当 | | 眼科 | 眼圧 右 0 | | 血液一般 | 好中球 | | 65 | 比重 | | 1.014 | 尿沈渣 | | A | 蛋白 | | (-) | | | | | | | | | | |
| | | | | 左 0 | | | Scheie H 右 0 | | | Scheie S 右 0 | | | 左 0 | | | ケトン | | (-) | | 潜血 | | (-) | | | | | | |
| メタボリックシンドローム判定 | 非該当 | | 眼科 | Scheie H 左 0 | | 血液一般 | 好塩基球 | | 1 | ウロビリノーゲン | | (±) | 尿沈渣 | | A | ビリルビン | | (-) | | | | | | | | | | |
| | | | | Scheie S 左 0 | | | 糖尿病 右 (-) | | | 左 (-) | | | 好酸球 | | | 1 | | ケトン | | (-) | | 潜血 | | (-) | | | | |
| メタボリックシンドローム判定 | 非該当 | | 眼科 | 糖尿病 左 (-) | | 血液一般 | 好酸球 | | 1 | PH | | 7 | 尿沈渣 | | A | ケトン | | (-) | | | | | | | | | | |
| | | | | 白内障 右 | | | 左 | | | 好塩基球 | | | 1 | | | ウロビリノーゲン | | (±) | | ケトン | | (-) | | | | | | |
| メタボリックシンドローム判定 | 非該当 | | 眼科 | 白内障 左 | | 血液一般 | 好塩基球 | | 1 | PH | | 7 | 尿沈渣 | | A | ケトン | | (-) | | | | | | | | | | |
| | | | | 視神経乳頭陥凹 | | | 右 | | | 好塩基球 | | | 1 | | | ウロビリノーゲン | | (±) | | ケトン | | (-) | | | | | | |
| メタボリックシンドローム判定 | 非該当 | | 眼科 | 視神経乳頭陥凹 | | 血液一般 | 好塩基球 | | 1 | PH | | 7 | 尿沈渣 | | A | ケトン | | (-) | | | | | | | | | | |
| | | | | 左 | | | 好塩基球 | | | 1 | | | ウロビリノーゲン | | | (±) | | ケトン | | (-) | | 潜血 | | (-) | | | | |

判定区分

A. 異常なし B. 軽度異常 C. 要経過観察 D1. 要治療 D2. 要精密検査 E1. 治療中 E1. 定期観察中